

Übersicht zu gängigen Infektionskrankheiten in der Kitas (gilt für Kinder und Mitarbeiter)

Erkrankungen	Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiedenzulassung nach Erkrankung	Ausschluss von Kontaktpersonen
Magen-Darm-Infektionen (Brechdurchfall)				
Noroviren	1-3 Tage	meist 7-14 Tage	2 Tag nach Ende der Symptomatik	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik
Rotaviren	1-3 Tage	während akutem Krankheitsstadium und solange Virus im Stuhl ausgeschieden wird	3 Tag nach Ende der Symptomatik	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik
Salmonellen	6-72 Stunden (meist 13-36 Stunden)	7 Wochen oder länger	Nach Ende der Symptomatik	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik
Campylobacter	2-5 Tage (in Einzelfällen 1-10 Tage)	2 bis 4 Wochen	Nach Ende der Symptomatik	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik
Yersinien	ca. 3-10 Tage	in der Regel 2-3 Wochen (solange Symptome andauern)	Nach Ende der Symptomatik	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik
Shigellen	ca. 13-96 Stunden		Nach Genesung und 3 neagtive Stuhlproben	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik
Atemwegserkrankungen (Erkältungskrankheiten, Influenza)				
ohne Fieber			Kein Ausschlussgrund	Nicht erforderlich
mit Fieber (> 38°C)			24 Stunden fieberfrei	Nicht erforderlich
Influenza (echte Grippe)	1-2 Tage		Nach Genesung	Nicht erforderlich

Übersicht zu gängigen Infektionskrankheiten in der Kitas (gilt für Kinder und Mitarbeiter)

Erkrankungen	Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung nach Erkrankung	Ausschluss von Kontaktpersonen
Masern, Mumps, Röteln, Windpocken (Varizellen)				
Masern	8-10 Tage bis zum Beginn des katarrhalischem Stadium (Fieber, klakspritzerähnliche Koplik-Flecken, usw.)	3-5 Tage vor Auftreten des Hautauschlages und bis 4 Tage nach Auftreten	Nach Genesung und frühestens am 5. Tag nach Beginn des Ausschlages	Rücksprache mit Hygienekontrolleur. Ausschluss entfällt bei Impfschutz/ Immunität
Mumps	16-18 Tage (12-25 Tage möglich)	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis 9 Tage nach Beginn der Drüenschwellung	Nach Genesung, frühestens am 9. Tag nach Schwellung der Ohrspeicheldrüse (Parotisschwellung)	Rücksprache mit Hygienekontrolleur. Ausschluss entfällt bei Impfschutz/ Immunität
Röteln	14-21 Tage	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis zu Beginn des Ausschlages	Nach Ende der Symptomatik	Rücksprache mit Hygienekontrolleur. Ausschluss entfällt bei Impfschutz/ Immunität
Windpocken	14-16 Tage (8-21 Tage sind möglich)	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis 7 Tage nach Auftreten des Hautausschlages	Eine Woche nach Krankheitsbeginn möglich	Rücksprache mit Hygienekontrolleur. Ausschluss entfällt bei Impfschutz/ Immunität
Ansteckende Leberentzündungen				
Hepatitis A	25-30 Tage (möglich: 15-max. 50 Tage)	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis ca. 1 Woche nach Beginn der Gelbsucht	Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Rücksprache mit Hygienekontrolleur. Ausschluss entfällt bei Impfschutz/ Immunität
Hepatitis E	40 Tage (15-60 Tage kommen vor)	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis ca. 1 Woche nach Beginn der Gelbsucht	Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Rücksprache mit Hygienekontrolleur

Übersicht zu gängigen Infektionskrankheiten in der Kitas (gilt für Kinder und Mitarbeiter)

Erkrankungen	Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiedenzulassung nach Erkrankung	Ausschluss von Kontaktpersonen
Keuchhusten (Pertussis)				
Keuchhusten	9-10 Tage (6-20 Tage sind möglich)	Ohne Behandlung bis zu 3 Wochen, mit Behandlung (Antibiotika) 3-7 Tage	5 Tage nach Beginn der antibiotischen Therapie, sonst 3 Wochen nach Hustenbeginn	Wenn Husten auftritt (Abklären bei Hausarzt)
Meningokokken, Haemophilus influenzae (Meningitis)				
Meningokokken Erkrankungen	3-4 Tage (2-10 Tage sind möglich)	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis 24 Stunden bei erfolgreicher Antibiotikatherapie	Nach erfolgreicher Antibiotikatherapie und Genesung	Rücksprache mit Hygienekontrolleur
Haemophilus influenzae (Meningitis)	2-10 Tage	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis 24 Stunden bei erfolgreicher Antibiotikatherapie	Nach erfolgreicher Antibiotikatherapie und Genesung	Rücksprache mit Hygienekontrolleur
Borkenflechte, Scharlach				
Ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)	1-3 Tage, selten länger	24 Stunden nach Beginn einer wirksamen Therapie	24 Stunden nach Beginn der antibiotischen Therapie, ansonsten nach Abheilung der befallenen Hautstellen	Nicht erforderlich
Scharlach (eitrige Halsentzündung)	1-3 Tage, selten länger	24 Stunden nach Beginn einer wirksamen Therapie	24 Stunden nach Beginn der antibiotischen Therapie, sonst nach Genesung	Nicht erforderlich

Übersicht zu gängigen Infektionskrankheiten in der Kitas (gilt für Kinder und Mitarbeiter)

Erkrankungen	Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiedenzulassung nach Erkrankung	Ausschluss von Kontaktpersonen
Krätze (Skabies), Kopfläuse				
Krätze (Skabies)	2-5 Wochen	Die Ansteckungsfähigkeit bleibt erhalten, solange lebende Krätzmilben auf bzw. in der Haut nachzuweisen sind	Nach Behandlung	Mitbehandlung enger Kontaktpersonen, kein genereller Ausschluss. Rücksprache mit Hygienekontrolleur
Kopfläus	Entfällt	Die Ansteckungsfähigkeit ist gegeben, solange die Betroffenen mit Läusen befallen und noch nicht adäquat behandelt sind	Nach Behandlung	Nein, aber Kontrolle erforderlich
Augenerkrankungen				
Ansteckende Bindehautentzündung (Adenovirus Konjunktivitis)	5-12 Tage		Wenn kein Sekret /Rötung mehr vorhanden ist	Nicht erforderlich, solange keine Symptome auftreten
Eitrige (bakterielle) Bindehautentzündung	Entfällt		Nach Genesung	Nicht erforderlich, solange keine Symptome auftreten
Weiter Infektionskrankheiten				
Hand-Fuß-Mundkrankheit	3-10 Tage (auch 1 - 30 Tage)	Schon vor Auftreten der Bläschen	Nach Genesung	Nicht erforderlich
Ringelröteln	7-18 Tage	Vor auftreten erster Symptome möglich, bis zum Beginn des Ausschlages	Nach Genesung, Aushang zur Information der Sorgeberechtigten	Nicht erforderlich
Dreitagesfieber	7-14 Tage	Nach Genesung	Nach Genesung	Nicht erforderlich